

## University of Groningen

### De bloedafbraak bij kinderanaemiën

Beekman, Hendrikje

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1940

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Beekman, H. (1940). *De bloedafbraak bij kinderanaemiën*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN.

### I.

Stomatitis epidemica is een zeldzaam optredend ziektebeeld, alhoewel de infectiekansen groot zijn; noch de stomatitis, noch de andere verschijnselen zijn specifiek, zoodat de diagnose alleen gesteld kan worden op de positieve caviaenting.

*Arch. f. Dermatolog. und Syph. Bd. 180, 1940, blz. 189.*

### II.

In ernstige gevallen van zwangerschapsvergiftiging (dreigende of manifeste eclampsie) is insraveneuze toediening van sterk geconcentreerde glucoseoplossingen nuttig.

*Geburtshilfe und Frauenheilkunde Hft. 2. 1940.*

### III.

Het ontstaan van groote bloedingen in de hersenen bij de hypertensie moet opgevat worden als een gevolg van een plaatselijke beschadiging van den vaatwand.

*Zeitschr. f. d. gesamte Neurologie und Psychiatrie  
Bd. 167, 1939 blz. 301.*

### IV.

Bij gevallen van Endocarditis lenta beproeve men een gecombineerde behandeling met sulfapyridine en heparine.

*Journal of the Americ..Med. Ass.  
vol 113, 1939, blz. 1700 en 1702.*

### V.

Voor het verwijderen van een zieke appendix is de wisselsnede volgens Mc. Burney te verkiezen boven de pararectale snede volgens Lennander, als de diagnose vaststaat en er geen complicaties met andere organen of een abnormale ligging zijn te verwachten.

### VI.

Alvorens de diagnose neurasthenie te stellen, overwege men een deficientieziekte.

*Journ. of. Am. Med. Ass. vol 113, 1939, blz. 931.*

## VII.

Bij de endoscopie van de diepere lucht- en spijswegen is rugligging van den patiënt te verkiezen boven de zittende houding.

## VIII.

Het is gewenscht, ook bij schijnbaar zekere gevallen van genuïne epilepsie een encephalographisch onderzoek te verrichten.

*Allgem. Zeitschr. f. Psych. und ihre Grenzgeb., Bd. 116, Hft. 1/2.  
Psychiatr. en Neurolog. Bladen Juli/Aug. 1939.*

## IX.

Bij de behandeling van een strabismus concomitans dient niet alleen gelet te worden op cosmetisch resultaat, doch men dient ook te streven naar functieherstel van het strabeerende oog.

*Klin. Monatsblätter f. Augenh. Bd. 105, 1940.*

---